

1. What is TAVFLOX and what it is used for
2. Before you take TAVFLOX
3. How to take TAVFLOX
4. Possible side effects
5. How to store TAVFLOX
6. Further information

- Sinuses.
- Lungs, in people with long-term breathing problems or pneumonia.
- Urinary tract, including your kidneys or bladder.
- Prostate gland, where you have a long lasting infection.
- Skin and underneath the skin, including muscles. This is sometimes called 'soft tissue'.

Do not take TAVFLOX tablets at the same time as the following medicines. This is because it can affect the way TAVFLOX tablets work:

- iron tablets (for anemia), magnesium or aluminum-containing antacids (for acid or heartburn) or sulcralfate (for stomach ulcers). See Section 3 "If you are already taking iron tablets, antacids or sulcralfate" below.

- Severe skin rashes which may include blistering or peeling of the skin around your lips, eyes, mouth, nose and genitals.
- Loss of appetite, skin and eyes becoming yellow in colour, dark-coloured urine, itching, or tender stomach (abdomen). These may be signs of liver problems.

Tell your doctor if any of the following side effects gets serious or lasts longer than a few days:

- Common (affects less than 1 person in 10)**
 - Feeling sick (nausea) and diarrhoea.
 - Increase in the level of some liver enzymes in your blood.
- Uncommon (affects less than 1 person in 100)**
 - Itching and skin rash.
 - Loss of appetite, stomach upset or indigestion (dyspepsia), being sick (vomiting) or pain in your stomach area, feeling bloated (flatulence) or constipation.
 - Headache, feeling dizzy, a spinning feeling (vertigo), feeling sleepy, sleeping problems or feeling nervous.
 - Blood tests may show unusual results due to liver or kidney problems.
 - Changes in the number of white blood cells shown up in the results of some blood tests.
 - General weakness.
 - Changes in the number of other bacteria or fungi may increase, which may need to be treated.

THIS IS A MEDICAMENT	
- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. - Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. -The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks. - Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. -Keep all medicaments out of reach of children.	
Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists	

تافلوكس

ليفولوكساسين ٥٠٠ ملغم

اقرأ كامل هذه النشرة بشكل دقيق قبل أن تبدأ أنت أو طفلك بتناول هذه الأقراص.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرأتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، يُرجى سؤال طبيبك أو الصيدلاني.
- تم وصف هذا الدواء لك أو لطفلك، لا تعطي هذا الدواء للأخرين، فقد تؤذيهم، حتى لو كانوا يعانون من أعراض تشبه أعراض الـ التي عانيت أنت أو طفلك منها.
- في حال اشتدت عليك أحد الأعراض الجانبية أو في حال لاحظت ظهور أي أعراض جانبية أخرى غير تلك المذكورة في هذه النشرة، يُرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني بذلك على الفور.

في هذه النشرة:

١. ما هو تافلوكس ولماذا يُستخدم؟
٢. قبل أن تأخذ تافلوكس
٣. ما هي الطريقة المثلى لاستعمال تافلوكس؟
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين تافلوكس؟
٦. معلومات إضافية

١. ما هو تافلوكس ولماذا يُستخدم؟

اسم دواك هو أقراص تافلوكس. تحتوي أقراص تافلوكس على دواء يُعرف باسم ليفولوكساسين ينتمي إلى مجموعة أدوية تسمى المضادات الحيوية. يعتبر ليفولوكساسين مضاداً حيوياً من عائلة الكينولون، يعمل على قتل البكتيريا التي تسبب التهابات في جسمك.
إذ يمكن استخدام أقراص تافلوكس لمعالجة التهابات في:

- الجيوب الأنفية.
- الرئتين، لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفس طويلة الأجل أو التهاب الرئوي.
- المسالك البولية، بما في ذلك الكلى أو المثانة.
- عددة البروستات، حيث يوجد لديك التهاب طويل الأمد.
- الجلد وتحت الجلد، بما في ذلك العضلات. وهذا ما يسمى أحياناً بـ «التهابات الأسجة اللينة».

٢. قبل أن تأخذ تافلوكس:

تحذيرات وموانع استخدام:

استشر طبيبك قبل أن تأخذ سيبروجرام.

- [..]
- إذا تم تشخيصك بتضخم أو انسداد الأوعية الدموية بالشريان الأبهرى.
- إذا سبق أن حدث لك تمزق في الشريان الأبهر.
- إذا كان أحد افراد عائلتك قد أصيب بتضخم أو انسداد الأوعية الدموية بالشريان الأبهر أو سبق أن حدث له تمزق في الشريان الأبهر.
- (اضطراب في السجج الضام، متلازمة مارفان، متلازمة إهار-دخالفوس، أو اضطرابات فـ الأوعية الدموية كإلتهاب الشرايين، تضخم الشرايين، متلازمة بهجة، ارتفاع ضغط الدم أو تصلب الشرايين
- [..]

إذا شعرت بألم شديد ومغشى في البطن أو الصدر أو الظهر اذهب إلى الطوارئ على الفور

أ. لا تستخدم تافلوكس

- إذا كان لديك تاريخ حساسية (حساسية زائدة) لليفولوكساسين أو لأي مضادات حيوية آخر من عائلة الكينولون مثل موكسيفلوكساسين أو سيبروفلوكساسين أو أوفلوكساسين أو أي من المكونات الأخرى المكونة لأقراص تافلوكس (الفرجة في القسم ٦ أدناه).
- إذا كنت تعاني من حساسية عالية وتشمل: الطفح الجلدي، مشاكل البلع أو مشاكل في التنفس، تورم الشفاه، الوجه، الحلق أو اللسان.
- أصبت مسبقاً بالصرع.
- إذا عانيت مسبقاً من مشكلة مع الأوتار مثل التهاب أوتار كلى على علاقة بعلاج «مضاد حيوي الكينولون». الأوتار هي الأجزاء التي تربط عضلات جسمك مع هيكل العظمى.
- إذا كنت طفلاً أو حديث المراهقة.
- إذا كنت حاملاً أو ستكوين حاملاً أو تعتدين أنك حامل.
- إذا كنت مرضعة.
- لا تتناول هذا الدواء إذا انطبقت إحدى الحالات المذكورة أعلاه عليك. إذا لم تكن متأكدًا مما تعالجه، استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل تناولك أقراص تافلوكس.
- ب. توخ المزيد من الحذر عند تناول أقراص تافلوكس:**

تأكد من طبيبك أو الصيدلاني قبل تناولك لدواءك إذا:

- كنت تبلغ من العمر ٦٥ عاماً أو أكثر.

- كنت تستخدم كورتيكوستيرويد المعروفة أحياناً بالستيرويدات، (انظر إلى « تناول أدوية أخرى» أدناه).

- سبق لك الإصابة بنوبة.

- عانيت من إصابة في السماع كنتيجة لسكتة دماغية أو لأي إصابة أخرى في الدماغ.

- كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- كان لديك ما يُعرف باسم «كثرة الدم القولي» – سداسي فوسفات الجلوكوز النازع للهيدروجين». إذ أن لديك احتمالية كبيرة للإصابة بمشاكل خطيرة في الدم بمجرد تناولك لهذا الدواء.
- سبق لك الإصابة بمشاكل صحية عظية.
- سبق لك الإصابة بأمراض القلب.
- كنت مصاباً بالسكري.
- سبق لك أن عانيت من مشاكل في الكبد.

إذا لم تكن متأكدًا من أن أي حالة مما ذكر أعلاه تنطبق عليك أم لا، استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل تناولك أقراص تافلوكس.

ت. تناول أدوية أخرى أو مكملات عشبية أو غذائية

نرجو منك أن تغير طبيبك أو الصيدلاني إن كنت تتناول أو تتناول مسبقاً أي أدوية أخرى. تشتمل هذه الأدوية على أي دواء تمت بشرائه دون وصفة طبية، كالأدوية العشبية مثلاً. يعود السبب وراء حرصنا على قيامك بذلك إلى أن تناول أقراص تافلوكس يمكن أن يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية الأخرى و على العكس أيضاً، إذ يمكن لبعض هذه الأدوية أن تقلل من عمل أقراص تافلوكس.
بالإضافة، أخبر طبيبك في كل حالة تتناول أيًا من الأدوية التالية. إذ أن تلك قد يزيد من فرص إصابتك بآثار جانبية أخرى إذا تناولتها مع أقراص تافلوكس:
كورتيكوستيرويد المعروفة أحياناً بالستيرويدات- و المستخدمة لعلاج التهابات. من المحتمل أن تصاب بالتهاب حاد و/أو انكسار في أوتارك.
الوارفارين – يستخدم لتقليل مخاطر جلطات الدم. قد تكون أكثر عرضة لنزيف و قد يحتاج طبيبك إلى إجراء فحوصات دم دورية ليأكد من فعالية تخثر دمك.
الثيوفيلين – يستخدم لعلاج مشاكل التنفس. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة إذا أخذت مع أقراص تافلوكس.
العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات – و المستخدمة لعلاج الألم و الالتهابات، مثل الأسبرين و إيبوبروفين و فينوبفين و كيتوبروفين و الاندوميثاسين. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة إذا أخذت مع أقراص تافلوكس.
السيكلوسبورين – يستخدم بعد عمليات زرع الأعضاء. قد تكون أكثر عرضة لحصول الآثار الجانبية للسيكلوسبورين.
-أي أدوية تعرف بالتأثيرها على نضبات القلب، وتشتمل على الأدوية المستخدمة لصربات القلب غير الطبيعية (مضادات اضطراب النظم مثل الكينيدين و الأليدارون) و تلك المستخدمة لكتئاب (مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة مثل أميتريبتيلين و إيميبرامين) و تلك المستخدمة للالتهابات البكتيرية (مضادات المكاروليد الحيوية مثل الازيثروميسين و أزيثروميسين و كلاريثروميسين).
- البروبيوتيك – المستخدم لمرض الفرس وميسميتين. تستخدم في حالات الفرجة والفرقة. ينبغي توخي الحذر خاصة عند تناول أي من هذه الأدوية مع تافلوكس.
إذا كان لديك مشاكل في الكبد، فيوصي طبيبك بتجنب حرجة أقل.

لا تتناول أقراص تافلوكس في نفس وقت تناول الأدوية التالية، نظراً لإحتمالية تأثيرها على طريقة عمل أقراص تافلوكس:
- أقراص الحديد (لمرض فقر الدم) أو . المغنيسيوم أو مضادات الحموضة التي تحتوي على الألمنيوم (لعلاج الحموضة أو حرقة المعدة) أو

سوكرفالات (لعلاج قرحة المعدة). انظر القسم ٣ «إذا كنت تأخذ بالفعل أقراص الحديد أو مضادات الحموضة أو سوكرفات أدناه».

اختبارات البول من أجل المخدرات:

قد تعرض اختبارات البول « نتائج خاطئة» لمسكنات الألم القوية و المعروفة بـ « الأفيون» لدى الأشخاص الذين يتناولون أقراص تافلوكس. إذا كان طبيبك يصدد إجراء فحص بول، أخبره أنك تتناول أقراص تافلوكس.

ث. الحمل و الرضاعة الطبيعية

لا تتناولي هذا الدواء إذا:

- إذا كنتي حاملاً أو ستكوينين حاملاً أو تعتدين أنك حامل.
- إذا كنتي مرضعة أو تخططين لإرضاع طفلك رضاعة طبيعية.

اطلبي نصيحة طبيبك أو الصيدلاني قبل تناولك أقراص تافلوكس إذا كنتي حاملاً أو ترضعين طبيعياً من ثديك.

ج. القيادة و استخدام الآلات

قد تعاني من آثار جانبية بعد تناولك لهذا الدواء بما فيها الشعور بالدوار أو النعاس أو الشعور بالدوخة أو اضطرابات في مدى نظرك. قد تؤثر بعض هذه الأعراض الجانبية على قدرتك على التركيز و على سرعة رد فعلك. في حال حدوث ذلك، لا تقم بقيادة السيارة أو القيام بأي عمل يتطلب منك مستوى عال من التركيز.

٣. ما هي الطريقة المثلى لاستعمال تافلوكس؟

تناول أقراص تافلوكس دائماً و تماماً كما يطلب منك الطبيب. عليك التحقق من طبيبك أو الصيدلاني إذا لم تكن متأكدًا من ذلك.

تناول الدواء

- تناول هذا الدواء عن طريق الفم.
- ابتلع الأقراص كاملة و مرة واحدة مع كوب من الماء.
- يمكن تناول الأقراص أثناء تناول الوجبات أو في أي وقت بين الوجبات.

احم بشرتك من أشعة الشمس.

ابق بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أثناء تناولك لهذا الدواء. يمكن أن تصبح بشرتك حساسة للغاية عند التعرض للشمس و من المحتمل أن تسبب حروقاً فيها أو تتقشر أو تسبب ظهور بثور كثيرة على بشرتك إذا لم تتخذ الاحتياطات التالية:

- تأكد من استخدامك كريم و/أو شمس ذو معامل عالي.
- ارتد دائماً قبعة رأس و ملابس تغطي ذراعك و أرجلك.
- تجنب التعرض للشمس و الأسماك المستخدمة لإسقاط السمرة على بشرة الجلد.
- إذا كنت تتناول أقراص الحديد أو مضادات الحموضة أو سوكرفالات
- لا تتناول هذه الأقراص في نفس وقت تناولك لأقراص تافلوكس. خذ جرعتك على الأقل قبل أو بعد ساعتين من تناول أقراص تافلوكس.

ما هي الجرعة المناسبة؟

يقرر طبيبك عدد أقراص تافلوكس التي تستعدي حالكت تناولها.

- ستستخدم الجرعة المحددة على نوح الالتهاب الذي تعاني منه و على مكان الالتهاب في أي جزء من أجزاء جسمك.

- سيحدد طول فترة علاجك على شدة الالتهاب الذي تعاني منه.

- إذا شعرت بأن تأثير دواك ضعيف جداً أو قوي جداً، لا تقم بتغيير جرعتك بنفسك، استشر طبيبك أولاً.

البالغون و كبار السن

الجيوب الأنفية:

- قرص دواء كامل من تافلوكس ٥٠٠ ملغم، مرة واحدة كل يوم.

- الرئتين، لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفس طويلة الأجل .

- نصف قرص أو قرص كامل من تافلوكس ٥٠٠ ملغم، مرة واحدة كل يوم.

التهاب البروي:

قرص دواء كامل من تافلوكس ٥٠٠ ملغم، مرة واحدة أو مرتان كل يوم.

- نصف قرص من تافلوكس ٥٠٠ ملغم، مرة واحدة كل يوم.

غدة البروستات

- قرص دواء كامل من تافلوكس ٥٠٠ ملغم، مرة واحدة كل يوم.

الجلد وتحت الجلد، بما في تلك العضلات

- نصف قرص أو قرص كامل من تافلوكس ٥٠٠ ملغم، مرة واحدة أو مرتان كل يوم.

البالغون الذين يعانون من أمراض في الكبد

قد يصعب طبيبك إعطاءك جرعة أقل من هذه الدواء.

الأطفال و المراهقون

لا يجب إعطاء هذا الدواء للأطفال و المراهقين.

- إذا تناولت أكثر من **العدد الموصى به من أقراص تافلوكس**.

إذا أخذت عن طريق الخطأ أكثر من العدد الموصى به من أقراص تافلوكس، أخبر طبيبك أو احصل على نصيحة طبية على الفور. خذ عينة الدواء منك حتى يعرف الطبيب ماذا أخذت. قد تحدث الآثار الجانبية التالية: نوبات تشنجية والشعور بالاضطراب والدوار و بآل ك أقل وعياً بالإضافة إلى مشاكل في القلب - مما يؤدي إلى نذات متفاوتة للقلب فضلاً عن شعور بالغثاين.

إذا نسيبت تناول جرعتك من أقراص تافلوكس.

إذا نسيبت تناول جرعة، خذها مباشرة بمجرد تذكرك لها، و لا تقم بذلك إذا تذكرت ذلك في وقت قريب من موعد جرعتك اللاحقة. لا تصاعف جرعتك اللاحقة لتعويض عن نسيبك الجرعة الأولى.

إذا توقفت عن تناول أقراص تافلوكس.

لا تتوقف عن تناول أقراص تافلوكس لمجرد إحساسك بأنك أصبحت جيداً أو أنك تتحسن. فمن المهم أن تكمل الجرعات التي وصفها لك الطبيب. إذا توقفت عن تناول أقراص تافلوكس في وقت مبكر جداً قد يعود التهابك مرة أخرى و قد تسوء حالتك الصحية و قد تصبح البكتيريا مقاومة للدواء. إذا أردت الاستمرار عن المزيد من الأمور حول كيفية استخدام هذا الدواء، لا تتردد بسؤال طبيبك أو الصيدلاني.

٤. الآثار الجانبية المحتمنة

تافلوكس مثله مثل جميع الأدوية-تسبب تأثير جانبية على الرغم من أن العديد من الناس لا يصاب بها. تتراوح درجة هذه الأعراض من الخفيفة أو المعتدلة و تختفي عادة بعد فترة قصيرة جداً.

توقف عن تناول تافلوكس و اذهب لرؤية طبيبك أو اذهب مباشرة إلى المستشفى في حال لاحظت الأعراض الجانبية التالية:

نادرة جداً (تؤثر على شخص ١ من أصل ١٠,٠٠٠)

- إذا كنت عندك حساسية شديدة. قد تشتمل أعراض هذه الحساسية على: طفح جلدي أو مشاكل في البلع أو التنفس أو تورم الشفتين أو الوجه أو الحلق أو اللسان.
- توقف عن تناول تافلوكس و اذهب لرؤية طبيبك أو اذهب مباشرة إلى المستشفى في حال لاحظت أي من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية: تحتاج إلى علاج طبي على الفور:

نادرة (تؤثر على شخص ١ من أصل ١٠٠٠)

- اسهال شديد مصحوب بدم مع قطعات في المعدة و ارتفاع درجة الحرارة. قد تكون هذه علامات على وجود مشكلة الأمعاء الحادة.
- ألم و التهاب في الأوتار. أكثر ما يتأثر في هذه الحالة هو وتر أخيل (وتر العرقوب) و قد ينتج عن ذلك تكسر هذا الوتر.

- نوبات (تشنجات).

نادرة جداً (تؤثر على شخص ١ من أصل ١٠,٠٠٠)

- حروق الجلد أو وخز أو ألم أو خدر. هذه قد تكون علامات و مؤشرات على ما يعرف باسم « الاعتلال العصبي».
- أعراض أخرى:
- طفح جلدي شديد قد يشتمل على ظهور تقرحات أو تقشير للجلد حول الشفتين والعينين والفم والأف والأعضاء التناسلية.
- فقدان الشهية أو اصفرار العينين و الجلد أو أن يكون البول بلون داكن أو تقلص عموي (البطن). قد تكون هذه علامات على مشاكل في الكبد.
- أعراض شائعة (تؤثر على أقل من شخص واحد من أصل ١٠)

- الشعور بالغثاين و الإسهال.

- زيادة في مستوى بعض أنزيمات الكبد في الدم.

غير شائعة (تؤثر على أقل من شخص واحد من أصل ١٠٠)

- حكة و طفح جلدي.
- فقدان الشهية أو اضطراب في المعدة أو غير الهضم التقيؤ أو الألم في منطقة المعدة أو الشعور بالوخة أو الإسهال.
- الصداع أو اضطراب بالدوار أو الشعور بالدوخة أو بالنعاس أو مشاكل في النوم أو الشعور بالتوتر.
- قد تظهر اختبارات الدم نتائج غير عادية بسبب مشاكل في الكبد أو الكلى.
- تغييرات في عدد خلايا الدم البيضاء تظهر في نتائج بعض اختبارات الدم.
- ضعف عام.

- تغييرات في عدد البكتيريا الأخرى أو ازدياد اعداد الفطريات الأخرى والتي قد تحتاج إلى العلاج السريع.
- **نادرة (تؤثر على شخص ١ من أصل ١٠٠٠)**
- الشعور بالخز في اليدين والقدمين (مائل أو رجفة.
- الشعور بالتوتر (القلق) أو الاكتئاب أو المشاكل النفسية أو الشعور بضيق الصدر أو الشعور بالاضطراب.
- ضربات قلب بسرعة غير عادية أو انخفاض في ضغط الدم.
- الآلام المفاصل أو الآلم في العضلات.
- كثمات ونزيف بسهولة بسبب خفض في عدد الصفائح الدموية.
- انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (ترسمي العدلات).
- صعوبة في التنفس أو الصغير (تشنج قهبي).
- ضيق في التنفس (رحة في الصوت).
- حكة شديدة أو بثور (ترسمي الشرى).

نادرة جداً (تؤثر على أقل من شخص ١ من أصل ١٠,٠٠٠)

- حساسية زائدة من الشمس و ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
- انخفاض في مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم). و هذا مهم للأشخاص الذين يعانون من السكري.
- مشاكل في السمع أو النظر أو تغييرات في طريقة تذوقك و شمك للأشياء.
- رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (الهولوسة) أو تغير في رأيك و أفكارك (التفاعلات الذهانية) مع فرصة وجود أفكار انتحارية أو أفعال انتحارية.

- فقدان الدورة الدموية (صدمة قلبية).
- ضعف في العضلات. هذا مهم للأشخاص الذين يعانون من الوهن العضلي الوبيل (هو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي).
- التهاب الكلى قد تغيرات في الطريقة التي يعمل بها الكلى والفشل الكلوي في بعض الأحيان والتي قد تكون بسبب رد فعل لحساسية الكلى يُعزف باسم التهاب الكلىة الخلائي.
- الحمى و التهاب الحلق والشعور العام بمرض لا يزول. قد يرجع هذا إلى انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء.

أعراض جانبية أخرى تشمل:

- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم). من الممكن أن يجعل هذا الجلد شاحباً أو أصفر اللون بسبب تلف خلايا الدم الحمراء انخفاض في عدد جميع أنواع خلايا الدم
- الاستجابة المناعية المبالغ فيها (فرط الحساسية).
- التهاب الكلى (فرط التعرق).
- الآلام، بما في ذلك ألم في الظهر والصدر والأطراف.
- مشاكل في الحركة والمشي.
- الإصابة بالورعقيريا لدى الأشخاص الذين لديهم مسبقاً بورعقيريا (مرض أبيض نادر جداً).
- التهاب الأنابيب التي تحمل الدم حول الجسم (الأوعية الدموية) و بسبب ذلك قد تقلل الحسسي.
- في حال اشتدت عليك أحد الأعراض الجانبية أو في حال لاحظت ظهور أي أعراض جانبية أخرى غير تلك المذكورة في هذه النشرة، يُرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني بذلك على الفور.

يتم التليغ للسلطات التنظيمية الوطنية

لإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

- المملكة العربية السعودية:

- المركز الوطني للتحقق والسمات الدوائية
هاتف: ٠٥٧٦٦٢.١١٢٠٠٩٦٦
للاستصال بالإدارة التنفيذية للتحقق وإدارة الأزمات . هاتف: ٠٢٣٨٢٢٢.١١٢٠٢٨٢٢٢
تحويلية: ٢٢٤٠.٢٢٣٥٦.٢٢٢١٧
الخط الساخن: ١٩٩٩٩
الهاتف المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa
الموقع الإلكتروني: www.sfd.gov.sa/npc

• دول الخليج الأخرى:

- الرجاء الاتصال بالوزسات والهيئات الوطنية في كل دولة.

٥. كيفية تخزين تافلوكس؟

- تحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.
- احتفظ في العبوة الأصلية من أجل الحماية من الضوء والرطوبة
- احتفظ بعيداً عن متناول و مراء الأطفال.
- لا يحتاج هذا الدواء إلى ظروف تخزين خاصة و لكن يُفضل إبقاء أقراص تافلوكس في شريطها الأصلي و وضعها في مكان جاف.
- لا تتناول أقراص تافلوكس بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها المبين على العبوة الكرتون و على الرفقة المعدنية للأقراص.
- لا يجب التخلص من الأقراص عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. سوف تساعد هذه التاثير على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

على ماذا تحتوي أقراص تافلوكس؟

المادة الفعالة في تافلوكس هي ليفوفلوكساسين. يحتوي كل قرص على ٥٠٠ ملغم من ليفوفلوكساسين. المكونات الأخرى في الأقراص هي: كروسوبوفون ، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز، مايكروكريستالين سيليلوز، صوديوم ستايريل هيدرومبولوز ، ثاني أكسيد التيتانيوم، تلك، مأكروجول، أكسيد الحديد الأحمر، أكسيد الحديد الأصفر، وأبوبادري الورد.

كيف تبدو أقراص تافلوكس و ما هي مكونات العبوة

أقراص تافلوكس هي أقراص مغلقة للاستخدام الفموي.

أقراص تافلوكس محفوفة في حزمة تغليف معدنية/البولي فينيل كلوريد و تحتوي على ٥ أقراص.

شركة الحقوق التسويق والشركة المصنعة

المركز الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة. (أقافون فارما) ص.ب. ٤١٨٠ الرياض ١١٤٩٦
المملكة العربية السعودية
هاتف ٢٤٢٧ ٥٠٦ – ٢٤٨ ٢٢٥ ٩٦٦ ٠٠
هاتف ٢٤٢٧ ٥٠٦ – ٢٤٨ ٢٢٥ ٩٦٦ ٠٠
فاكس ٤٢٢٣ ٢٢٥ (١١) ٩٦٦ ٠٠

تم اعتماد هذه النشرة بتاريخ (٢٠١٨/١١)، رقم الإصدار (٠٢).

مدة الصلاحية: سنتان

إن هذا الدواء	
الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يحرضك للخطر. إتبع بدقة وصفة الطبيب والخبرانية للإستعمال الممنوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك. الطبيب والصيدلي هما المسؤولان عما يطرأ عليك في الدواء و بفعله وضروره. لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك. لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب. لا تتركز الأدوية في تناولها للأطفال.	
محلب وزرارة الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب	