

Avomack Cutaneous Solution

10 ml & 15 ml
salicylic acid 16.7% w/w
lactic acid 16.7% w/w

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist, or nurse.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist, or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4

In this leaflet

1. What Avomack is and what it is used for.
2. What you need to know before you use Avomack.
3. How to use Avomack.
4. Possible side effects.
5. How to store Avomack.
6. Further information.

1. What Avomack is and what it is used for.

The name of your medicine is Avomack. It contains two medicines called salicylic acid and lactic acid. It works by softening the skin of a wart, causing it to peel off.

Avomack is used to treat warts.

Avomack solution is indicated for the treatment of warts, calluses, corns, and hardened skin.

- A wart is an infection in the top layers of the skin. It is caused by a virus.
- Warts can be spread when the virus touches damaged skin.
- It is more likely to spread in places which are warm and moist. Therefore, one of the most common places to catch warts is swimming pools.
- It can take from a few weeks to several months for the wart to appear.

2. What you need to know before you use Avomack

Do not use or apply Avomack if:

- you are allergic to the salicylic acid, lactic acid, or any of the other ingredients of Avomack (listed in Section 6);
 - you have warts on your face, around your back passage or genitals, moles, birthmarks, warts with hair growing from them or other sensitive areas.
 - the area of skin is irritated, reddened, or infected. Do not use on open wounds.
 - the child being treated is under 2 years of age. Do not use Avomack if the above applies to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before you start using Avomack.
- Take special care with Avomack**
- Do not inhale the vapour.
 - Do not use with other medicines on the affected area.
 - Avomack is not recommended for patients who suffer from diabetes, poor blood circulation or nerve damage to the hands and feet.
 - Avomack contains colophony, which may cause allergic skin reactions (contact dermatitis).
 - Avoid contact with eyes, other sensitive areas, and healthy skin. In case of accidental contact with the eyes or other sensitive areas, rinse well with water. If you apply Avomack to healthy skin, you may experience blistering. Stop use and talk to your doctor or pharmacist.
 - Avomack is not recommended to be used during or immediately after a viral infection. Do not use in children or teenagers during or after chicken pox, influenza, or other viral infections.
 - Avomack is not recommended to be used during pregnancy or breast-feeding.
 - If used during breast-feeding, take care to wash off all traces to avoid accidental swallowing by the child.

Children: Children under the age of 12 years should be treated under supervision. Treatment of children under the age of 2 years is not recommended.

3. How to use Avomack

If this medicine is from your doctor or pharmacist, do exactly as they have told you. Otherwise, follow the instructions below. If you do not understand the instructions, or you are not sure, ask your doctor or pharmacist or nurse.

Using Avomack

- Use Avomack once a day, before bedtime, using the brush in the pack.
- It may take 4 to 8 weeks for visible improvement.
- Keep using Avomack either until the wart has been treated for 12 weeks or until you can see the lines of your skin again (called 'ridge lines').
- Speak to a pharmacist or doctor if warts last longer than 12 weeks or if skin irritation develops.
- Avoid smoking or being near an open flame whilst using Avomack, or immediately after use.

How to use Avomack

1. Remove any plasters.
2. Soak the warts in hot water for five minutes.
3. Dry the area with your own towel.
4. Rub the top of the warts carefully with a pumice stone, nail file, coarse washcloth, or emery board.
5. Then put on enough Avomack to cover the warts. Try not to get it on the normal skin around the warts.

6. Let the Avomack dry thoroughly.
7. Cover the wart with a plaster if possible, to help the ingredients get to work.

To stop warts spreading to others

- Remember that warts can spread to others.
- Only use your own towel.
- If your warts are on the bottom of your feet, do not walk around bare foot.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Avomack may cause allergic skin reactions (allergic dermatitis), rash, dryness, scaling, irritation, itching, swelling, burning sensation, redness, excessive skin growth, discoloration of the skin, blistering, pain, and hypersensitivity at the site of application. If you accidentally apply Avomack to healthy skin, you may experience blistering and skin exfoliation.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist, or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

5. How to store Avomack

- Keep out of the sight and reach of children.
- Do not use Avomack after the expiry date stated on the bottle and carton.
- Store below 30°C.
- Protect from light.
- Shelf life after first opening is 30 days.
- Avomack is highly flammable, keep it away from naked flames.
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further information

What Avomack contains

- The active substances are lactic acid 16.7% w/w and salicylic acid 16.7% w/w.
- The other ingredient is Hydroxypropyl cellulose, Diethyl Phthalate, Acetone.

What Avomack looks like and the contents of

The Avomack is supplied in 10ml and 15ml amber colored glass.

Manufacturer & Marketing Authorisation Holder:

Middle East Pharmaceutical Industries Co Ltd (Avalon Pharma)
P.O.Box 4180 Riyadh 11491
2nd Industrial City, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (11) 2653948-2653427
Fax: +966 (11) 2654723

This leaflet was approved in [07/2021]

To report any side effect(s):

- **Saudi Arabia:**

The National Pharmacovigilance and Drug Safety Centre (NPC) • SFDA call centre: 19999 • E-mail: npc.drug@sfdagov.sa • Website: https://ade.sfda.gov.sa
• Other GCC States:
Please contact the relevant competent authority.
THIS IS A MEDICATION
- Medication is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. - Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication. - The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks. - Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. - Keep all medications out of reach of children.
Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists

منع نقل عدوى التآليل إلى الآخرين

نذكر أن التآليل يمكن أن تنتقل إلى الآخرين.

استخدم منشكك الخاصة فقط.

إذا كانت التآليل منتشرة في باطن قدميك، فلا تبرز حافتي القدمين.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

مثل جميع الأدوية يمكن لهذا الدواء أن يتسبب في حدوث آثار جانبية، على الرغم من أنها لا تصيب الجميع. قد يتسبب فوموك في حدوث تفاعلات الحساسية (التهاب الجلد التماسي)، والطفح الجلدي، والغثبات، وتكون الفشور، والتهيج، الحكة، والتورم، والإحساس بحرقان، والإحمرار، والدموع المفرطة للجلد، وبهتان الجلد، والألم، والحساسية المفرطة. يمكن وضع الدواء. في حال وضع فوموك عن غير قصد على الجلد السليم؛ فقد يصاب الجلد بالتهثر والتقرش.

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي أو الممرض/ة. وبشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير إرادة في هذه النشرة.

يُحفظ بعيدًا عن متناول ومراى الأطفال.
لا تستخدم أفرامك بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المُنوّن على الزجاجة والعبوة الخارجية.
تُخزن في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

- تحفظ بعيدا عن الاضائة.
العمر الافتراضي بعد الفتح هو ٣٠ يوما
مادة افوكام شديدة الاشتعال، احتفظ بها بعيدا عن اللهب المكشوف.
لا ينبغي التخلص من الادوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الادوية التي لم تعد لازمة. ستساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

ما هي محتويات أفوماك
المواد الفعالة في حمض اللاكتيك بنسبة ١٦,٧ من الوزن الإجمالي، وحمض الساليسيليك بنسبة ١٦,٧ من الوزن الإجمالي.
المكون الآخر هو الكولوديون المر (هيدروكسي بروبيل السيليلوز، ديثيل الفثالات، أسيتون).

يُفِيدُ يَبْدُو دَوَاءُ أَفُومَاكْ، وَمَا هِيَ مَحْتَوِيَّاتُ الْعَبْوَةِ
تَمَّ تَوْفِيرُ عِبَوَاتِ أَفُومَاكْ فِي زَجَاجَاتٍ بِحَجْمِ ١٠ مِلْ وَ ١٥ مِلْ.

شركة المصنعة وحامل تفويض التسويق
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة (أقلون فار ما)

١١٤٩١ م. ب. ١٦٨٠ الرياض
للمدينة الصناعية الثانية، الرياض، المملكة العربية السعودية

.. ٩٦٦ (١١) ٢٦٥ ٣٩٤٨ - ٢٦٥ ٣٤٢٧

تمت مراجعة هذه النشرة في ٢٠٢١/٠٧

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:
المملكة العربية السعودية:

- المركز الوطني للتبليغ والسلامة الدوائية (NPC)

- مركز الاتصالات الهيئة العامة للغذاء والدواء: ١٩٩٩٩
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa
- الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa>

• دول الخليج الأخرى:

• الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر طبي يؤخذ على صمغته واستخدامه خلالا لتعليمات بروتوكول العلاج.
- إن وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلي هما المختبران باتباع وصفات ومخاطر الأدوية.
- لا تفعل ذلك العلاج المجدد لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر الوصفة الطبية نفسها من تلقاء نفسك وبدون استشارة الطبيب.
- احتفظ بجميع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

محلى وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب

١. ما هو أومك، وقيم يُستخدم
٢. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام أومك
٣. كيفية استخدام أومك
٤. الأثر الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين أومك
٦. معلومات إضافية

اسم الدواء هو أقومك.
يحتوي هذا الدواء على حمض الساليسليك وحمض اللاكتيك. ويعمل عن طريق تليين التآليل (الزوائد الجلدية)، مما يؤدي بعد ذلك إلى تقشرها.

يُصمَّم باستخدام محلول أومك لملاحق الثآليل، والكالو، وسننار القدم، الجلد المتصلب.
من الثآليل عبارة عن عدوى تسببها الطفيليات العليا من الجلد. ويتسبب في حدوثها فيروس معين.
يمكن أن تنتشر هذه العدوى عندما يفرس الفيروس من الجلد التالف.
من المرجح انتشار هذه الثآليل في الأماكن المظلمة والرطبة لذا تعد حمامات السباحة من أكثر الأماكن شيوعاً للإصابة بالثآليل.
قد يستغرق ظهور الثآليل من بضعة أسابيع إلى عدة شهور.

١٠. لا يحتاج إلى مراجعة قبل الاستخدام النهائي.

في القسم (هـ)

إذا كانت التليق توجد على وجهك، أو حول الممر الحلقوي (المستقيم) أو الأعضاء التناسلية، أو الشمام، أو وحمة الولادة، أو التليق التي ينمو منها شعر أو من مناطق حساسة أخرى.

إذا كان الحبل متجعداً ومحمراً أو مصاباً بعوى. لا تستخدم الدواء على الجروح المفتوحة.

إذا كان الطفل تليقاً من معالجه من العاملين. لا تستخدم الدواء إذا كانت تليق عليك الحالات السابقة. وإذا كنت غير متأكد، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في استخدام أوفام.

[illegible]

٣. كيفية استخدام افومك

إذا تم وصف هذا الدواء لك من قبل الطبيب أو الصيدلي، يرجى الاتصال. إذا كانت التعليمات ليست واضحة، اسأل الطبيب

- استخدم أفوكا مرة واحدة في اليوم قبل المساء، باستخدام الفروشة الموجودة في العبوة.
- قد يستغرق الأمر من 4 إلى 8 أسابيع لحداث تحسن ملحوظ.
- تابع استخدام أفوكا حتى تتم معالجة التآليل لمدة ١٢ أسبوعاً، أو حتى تتمكن من رؤية خطوط الجلد مرة أخرى (تسمى «خطوط الجلد»).

- تحدث إلى الصيدلي أو الطبيب إذا استمر ظهور الثآليل لأكثر من ١٢ أسبوعاً، أو إذا ازداد تهيج الجلد.
- تجنب التئخين أو الاقتراب من اللهب المكشوف أثناء استخدام أفوماك أو فور استخدامه.

١. أزل أيّ لصقات.

٣. بلل التآليل بالماء الدافئ لمدة خمس دقائق.
٤. افرك المنطقة المصابة بمنشفة خاصة بك.
٥. جفف بعناية الجزء العلوي من التآليل بواسطة حجر الخفاف أو مبرد الأظافر أو منشفة خشنة أو لوح صنفرة.
٦. توضع قطنرات كافية من أومالك لتغطية التآليل. حاول ألا يلمس الجلد غير المصاب حول التآليل.
٧. اترك أومالك حتى يجف تماماً.
٨. قم بتغطية التآليل باللبصقات الطبية إذا أمكن، لمساعدة مكان أومالك على التفاعل.