

Salinose®

Nasal sodium chloride solution

Ingredients:

Each 1ml of Salinose contains Sodium Chloride 9mg

Indications:

Saline Solution to relieve nasal congestion

Side Effects:

In general, Salinose has no associated side effects.

Direction for use:

Usual dose of Salinose

- For Children (6 years) and adults 1 to 3 sprays in each nostril 1-3 times daily or as directed by the Physician.

Storage:

Store below 30° C

Presentation:

- 30 ml plastic sprayer bottle

THIS IS A MEDICAMENT

- -Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- -Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- -The doctor and the pharmacist are experts in medicines, their benefits and risks.
- -Do not by your self interrupt the period of treatment prescribed for you.
 -Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- -Do not repeat the same prescription without consult -Keep all medicaments out of reach of the children.

Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists.

 ϵ

Revision Date: 06/2021

Produced By:

Middle East Pharmaceutical Industries Co. Ltd. (Avalon Pharma), Riyadh, Saudi Arabia. Tel+966(11)2653948.

O Avalon Pharma

سالينوز®

محلول كلوريد الصوديوم للأنف

التركيب:

يحتوي كل ١ مل من سالينوز على كلوريد الصوديوم ٩ ملغم.

الإستطبابات:

محلول ملحي لتخفيف احتقان الأنف

التأثيرات الجانبية:

سالينوز ليس له أي تأثير ات جانبية مر افقة بشكل عام .

الجرعة الإعتيادية لسالينوز:

-للأطفال (٦ سنوات) و البالغين: ١-٣ رشة أنفية ، مرة إلى ثلاث يومياً أو حسب تعليمات الطبيب.

التخزين:

يخزن في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

التعبئة:

- يتو قر سالينوز بعبوات بالاستيكية مجهزة ببخاخ ، سعة ٣٠ مل.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
 - الطّبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
 - لا تقطع مدة العلاَّج المحددة لك من تلقاء نفسك.
 - لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
 - لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب وإتحاد الصيادلة العرب

تاريخ الإصدار: ٢٠٢١/٠٦